


OXITAMP[®]



OXITAMP KNITTED[®]



OXITAMP FIBRILLAR[®]
OXITAMP FIBRILLAIR[®]
OXITAMP FIBRILAR[®]



OXITAMP FIBRILLAR THIN[®]
OXITAMP FIBRILLAIR THIN[®]
OXITAMP FIBRILAR THIN[®]



OXITAMP FIBRILLAR 1
LAYER[®] OXITAMP FIBRILLAIR 1
LAYER[®] OXITAMP FIBRILAR 1
LAYER[®]



OXITAMP POWDER[®]
OXITAMP POUDRE[®]
OXITAMP POLVO[®]



OXITAMP GEL[®]




TIDESPON[®]



made in Italy

ABSORBABLE HEMOSTATS
HÉMOSTATIQUE
RÉSORBABLE HEMOSTÁTICO
ABSORBIBLE

CE 0373



Absorbable hemostat of oxidized regenerated cellulose with Ph acid



Main characteristics of Oxitamp®:

- Rapid hemostatic effect (2-4 minutes)
- Completely absorbable
- No harmful tissue reaction or reaction of hypersensitivity
- Maximum resistance and manageability
- Bactericidal effect
- Absorption times (5-8 days)

Indications:

Oxitamp® is used adjunctively in surgical procedures to assist in the control of capillary, venous, and small artery haemorrhages when ligation or other conventional methods of control are impracticable or ineffective.



Hémostatique résorbable en cellulose oxydée régénérée au PH Acide

Caractéristiques principales d'Oxitamp®:

- Effet hémostatique rapide (2 à 4 minutes)
- Complètement résorbable par hydrolyse
- Aucune réaction tissulaire néfaste ni de réaction d'hypersensibilité
- Résistance maximale et manipulation aisée
- Effet bactéricide
- Temps de résorption 5-8 jours

Indications:

Oxitamp® est utilisé comme complément chirurgical pour le contrôle des hémorragies capillaires, veineuses et des petites artères, dans les cas où la ligature ou les autres méthodes de contrôle conventionnelles, sont impraticables ou inefficaces.



Hemostático absorbible de celulosa oxidada y regenerada en PH ácido


Principales características de Oxitamp®:

- Rápido efecto hemostático (2-4 minutos)
- Absorbible completamente por vía hidrolítica
- Ausencia de reacciones nocivas de los tejidos o reacciones de hipersensibilidad
- Máxima resistencia y manejabilidad
- Efecto bactericida
- Tiempo de absorción 5-8 días

Indicaciones:

Oxitamp® se utiliza como presidio quirúrgico para el control de hemorragias en capilares, venas y pequeñas arterias cuando el vendaje u otros métodos convencionales de control son impracticables o ineficaces.

CODE CODE CÓDIGO	DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES CARACTERÍSTICAS	SIZE DIMENSION MEDIDAS	BOX CONFECTION CAJA
OT-005-125	GAUZE GAZE GASA	5 X 1,25 cm	20
OT-005-070	GAUZE GAZE GASA	5 X 7,5 cm	20
OT-005-035	GAUZE GAZE GASA	5 X 35 cm	10
OT-010-020	GAUZE GAZE GASA	10 X 20 cm	10



Absorbable hemostat of oxidized regenerated cellulose with Ph acid

The "Knitted" version is three times more thick and is characterized by a unique manufacturing process that offer maximum resistance to tearing. The product can be cut easily and applied according to the various surgical requirements.

Main characteristics of Oxitamp Knitted®:

- Rapid hemostatic effect (2-4 minutes)
- Completely absorbable
- No harmful tissue reaction or reaction of hypersensitivity
- Easy to cut and to conform
- Maximum resistance and manageability
- Bactericidal effect
- Average absorption time 5-8 days

Indications:

Oxitamp Knitted® can be used to control major bleeding such as parenchymatous organs.

Hémostatique résorbable en cellulose oxydée régénérée au PH Acide

La version "Knitted" est 3 fois plus épaisse et est caractérisée par un processus exclusif de fabrication offrant une résistance maximum à la déchirure. Le produit peut être découpé plus facilement et appliqué selon les diverses exigences chirurgicales.

Caractéristiques principales de l'Oxitamp Knitted®:

- Effet hémostatique rapide (2 à 4 minutes);
- Complètement résorbable
- Aucune réaction tissulaire néfaste ni de réaction d'hypersensibilité
- Résistance maximum à la tension
- Découpable et adaptable librement
- Effet bactéricide
- Temps d'absorption moyen 5-8 jours

Indications:

Oxitamp® Knitted peut être utilisé pour le contrôle des hémorragies plus importantes comme par exemple sur les organes parenchymateux.

Hemostático absorbible de celulosa oxidada y regenerada en PH ácido

La versión "Knitted" es 3 veces más densa y se caracteriza por un exclusivo proceso de elaboración que ofrece la máxima resistencia. El producto puede ser recortado más fácilmente y aplicado según las diversas exigencias quirúrgicas.

Principales características de Oxitamp Knitted®:

- Rápido efecto hemostático (2-4 minutos)
- Completamente absorbible
- Ausencia de reacciones nocivas de los tejidos o reacciones de hipersensibilidad
- Máxima resistencia tensil
- Recortable y manejable libremente
- Efecto bactericida
- Tiempo medio de absorción 5-8 días

Indicaciones:

Oxitamp® Knitted puede ser utilizado para el control de las hemorragias más importantes como por ejemplo en los órganos parenquimatosos.

CODE CODE CÓDIGO	DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES CARACTERÍSTICAS	SIZE DIMENSION MEDIDAS	BOX CONFECTION CAJA
OTS-025-025	GAUZE GAZE GASA	2,5 X 2,5 cm	20
OTS-005-007	GAUZE GAZE GASA	5 X 7,5 cm	20
OTS-007-010	GAUZE GAZE GASA	7,5 X 10 cm	10
OTS-015-023	GAUZE GAZE GASA	15 X 23 cm	5



Absorbable hemostat of oxidized regenerated cellulose with Ph acid

Main characteristics of Oxitamp Fibrillar®:

- Rapid hemostatic effect (2-4 minutes)
- Made in fibrillar form
- Completely absorbable
- No harmful tissue reaction or reaction of hypersensitivity
- Maximum resistance and manageability
- Bactericidal effect
- Average absorption time 5-8 days

Indications:

Oxitamp Fibrillar® is used adjunctively in surgical procedures to assist in the control of capillary, venous, and small artery haemorrhages when ligation or other conventional methods of control are impracticable or ineffective. The unique softness makes it particularly indicated for laparoscopic use.

Hemostático absorbible de celulosa oxidada y regenerada en PH ácido

Principales características de Oxitamp Fibrillair®:

- 7 capas
- Rápido efecto hemostático
- Realizado de forma fibrilar
- Completamente absorbible
- Ausencia de reacciones nocivas de los tejidos o reacciones de hipersensibilidad
- Resistencia y manejabilidad
- Efecto bactericida
- Tiempo medio de absorción 5-8 días

Indicaciones:

Oxitamp Fibrillar® se usa como presidio quirúrgico para el control de hemo- rragias en capilares, venas y pequeñas arterias cuando el vendaje u otros mé- todos convencionales de control son impracticables o ineficaces. Su exclusiva suavidad hace que sea particularmente indicado para uso lapa- roscópico.



CODE CODE CÓDIGO	DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES CARACTERÍSTICAS	SIZE DIMENSION MEDIDAS	BOX CONFECTION CAJA
OTF-025-005	GAUZE GAZE GASA	2,5 X 5 cm	10
OTF-005-010	GAUZE GAZE GASA	5 X 10 cm	5
OTF-010-010	GAUZE GAZE GASA	10 X 10 cm	5
OTL-025-005	GAUZE 1 LAYER GAZE 1 LAYER GASA 1 LAYER	2,5 X 5 cm	10
OTL-005-010	GAUZE 1 LAYER GAZE 1 LAYER GASA 1 LAYER	5 X 10 cm	5
OTL-010-010	GAUZE 1 LAYER GAZE 1 LAYER GASA 1 LAYER	10 X 10 cm	5
OTT-025-005	THIN	2,5 X 5 cm	10
OTT-005-010	THIN	5 X 10 cm	5
OTT-010-010	THIN	10 X 10 cm	5



Absorbable hemostat of oxidized regenerated cellulose with neutral Ph, in powder shape, sterile, ready to use.



Main characteristics of Oxitamp Powder®:

- Rapid hemostatic effect (2-4 minutes)
- Bactericidal effect
- Completely absorbable through hydrolysis (4-6 days) also in blood absence
- Due to its neutral pH, does not inactivate thrombin
- No harmful tissue reaction or reaction of hypersensitivity

Indications:

Oxitamp Powder® doesn't need to be assembled, must be used dry and directly sprayed where necessary the haemostasis. His exclusive sterilized dispenser allows an easier and faster application even in difficult surgical procedures when the area is hard to reach. Oxitamp Powder® can be used in many areas of surgery: e.g. plastic surgery, gynaecology, gastric resection, liver and gall bladder operations, thoracic and abdominal sympathectomy, thyroid operations, skin transplant, treatment of superficial injuries.

Hémostatique résorbable en cellulose oxydée régénérée au PH neutre, sous forme de poudre, prêt à l'emploi.



Caractéristiques principales de l'Oxitamp Poudre®:

- Effet hémostatique rapide (2-4 minutes)
- Complètement résorbable par hydrolyse (4-6 jours) même en l'absence de sang
- Aucune réaction tissulaire néfaste ni de réaction d'hypersensibilité
- De pH neutre: ne cause aucune désactivation de la thrombine
- Effet bactéricide

Indications:

Oxitamp Poudre® ne nécessite aucun assemblage, doit être utilisée sèche et pulvérisée directement sur le site où doit avoir lieu l'hémostase. La présentation du flacon à soufflet permet d'atteindre facilement les sites les plus difficiles d'accès. Oxitamp® Poudre peut être utilisé dans divers domaines de la chirurgie, par exemple chirurgie plastique, interventions gynécologiques, résection gastrique, intervention du foie et de la vésicule biliaire, sympathectomies thoraciques et abdominales, opérations de la thyroïde, greffe de la peau, traitement des lésions superficielles.

Hemostático absorbible de celulosa oxidada y regenerada en PH neutro, en forma de polvo, listo para el uso.



Principales características de Oxitamp Polvo®:

- Rápido efecto hemostático (2-4 minutos)
- Absorbible completamente por vía hidrolítica (4-6 días) también en ausencia de sangre
- Ausencia de reacciones nocivas de los tejidos o reacciones de hipersensibilidad
- Posee un pH neutro: por lo que no provoca inactivación de la trombina
- Efecto bactericida

Indicaciones:

Oxitamp Polvo® no requiere ninguna preparación, debe ser usado en seco y aplicado directamente en el sitio en el cual es necesaria la hemostasis. La particular confección en acordeón permite alcanzar fácilmente también partes de difícil acceso. Oxitamp® Polvo puede ser usado en diversas ramas de la cirugía, como por ejemplo la cirugía plástica, operaciones ginecológicas, resección gástrica, operaciones del hígado y a la vesícula biliar, simpatectomía torácica y abdominal, operaciones de tiroides, trasplantes de piel y tratamientos de lesiones superficiales.

CODE CODE CÓDIGO	DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES CARACTERÍSTICAS	SIZE DIMENSION MEDIDAS	BOX CONFECTION CAJA
OTP-01	POWDER GR.1 POUDRE 1 GRAMME POLVO GR.1	1 gr	5
OTP-02	POWDER GR. 2 POUDRE 2 GRAMME POLVO GR. 2	2 gr	5
OTP-03	POWDER GR. 3 POUDRE 3 GRAMME POLVO GR. 3	3 gr	5



Absorbable hemostat of oxidized regenerated cellulose with neutral Ph, in gel, ready to use.



Main characteristics of Oxitamp Gel®:

- Rapid hemostatic effect (2-4minutes)
- Bactericidal effect
- Completely absorbable through hydrolysis (4-6 days) also in blood absence
- Due to its neutral pH, does not inactivate thrombin
- No harmful tissue reaction or reaction of hypersensitivity

Indications:

Oxitamp Gel® can be used in different gynaecological and cholecyst. Indicated for open and laparoscopic surgery.

Hémostatique résorbable en cellulose oxydée régénérée au PH neutre, sous forme de gel.



Caractéristiques principales de l'Oxitamp Gel®:

- Effet hémostatique rapide (2-4 minutes)
- Complètement résorbable par hydrolyse (4-6 jours) même en l'absence de sang
- Aucune réaction tissulaire néfaste ni de réaction d'hypersensibilité
- De pH neutre: ne cause aucune désactivation de la thrombine
- Effet bactéricid

Indications:

Oxitamp Gel® peut être utilisé en chirurgies gynécologiques en chirurgie de la vésicule biliaire. Indiqué pour une utilisation en laparoscopie ou en chirurgie «open».

Hemostático absorbible de celulosa oxidada y regenerada en PH neutro, en forma de gel.



Principales características de Oxitamp Gel®:

- Rápido efecto hemostático (2-4 minutos)
- Absorbible completamente por vía hidrolítica (4-6 días) también en ausencia de sangre
- Ausencia de reacciones nocivas de los tejidos o reacciones de hipersensibilidad
- Posee un PH neutro: por lo que no provoca inactivación de la trombina
- Efecto bactericida

Indicaciones:

Oxitamp Gel® puede ser empleado en las diversas operaciones ginecológicas y colecistitis. Indicado para uso open y laparoscópico.

CODE CODE CÓDIGO	DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES CARACTERÍSTICAS	SIZE DIMENSION MEDIDAS	BOX CONFECTION CAJA
OTL-03	PRE-FILLED SYRINGE SERINGUE PRÊTE À L'EMPLOI JERINGA LISTA PARA EL USO	ml 3	5
OTL-L-03	LAPAROSCOPIC KIT KIT LAPARO KIT LAPARO	ml 3	5
OTL-06	PRE-FILLED SYRINGE SERINGUE PRÊTE À L'EMPLOI JERINGA LISTA PARA EL USO	ml 6	5
OTL-L-06	LAPAROSCOPIC KIT KIT LAPARO KIT LAPARO	ml 6	5



Tidespon® is an absorbable hemostat sponge, sterile, for local use, made from 100% porcine gelatine.

Characteristics:

Tidespon® adheres to the bleeding site and absorb approximately 50 times its own weight. Due to the uniform porosity of Tidespon, blood platelets are caught and the coagulation cascade is activated, transforming soluble fibrinogen into a net of insoluble fibrin which stops the

bleeding. when implanted into tissue, Tidespon® is absorbed within 3-5 weeks. Tidespon® does not provoke any harmful tissue reaction or any reaction of hypersensitivity. The advantage of Tidespon® is the ability to use it simultaneously with antibiotics, chemotherapeutic medications or thrombin without any reduction of the sponge's haemostatic effect.

Indications:

Tidespon® is a local haemostatic sponge for use in surgical procedures that involve venous bleeding and oozing where traditional haemostasis is difficult or impracticable and the use of non-absorbable materials is undesirable.

Es una esponja de gelatina hemostática absorbible, estéril, para uso local, constituida al 100% por gelatina.

Características:

Tidespon® se adhiere a la hemorragia y absorbe una cantidad de 50 veces su peso. Gracias a la uniforme porosidad de Tidespon®, las plaquetas quedan atrapadas y la cascada de coagulación se activa transformando

hemorragia. implantado en el tejido Tidespon® se absorbe en 3-5 semanas. Tidespon® no provoca reacciones negativas en los tejidos ni reacciones de hipersensibilidad. La ventaja de Tidespon® es la posibilidad de usarlo simultáneamente a un tratamiento antibiótico, o con la quimioterapia trombina, sin reducción del efecto hemostático de la esponja.

Eponge de gélatine hémostatique résorbable, stérile, pour u sage local, constituée à 100 % d'origine porcine.

Caractéristiques:

Tidespon® adhère au site hémorragique et absorbe environ 50 fois son propre poids. Grâce à la porosité uniforme de Tidespon®, les plaquettes sanguines sont capturées et la cascade de coagulation est activée, fibrinogène soluble en réseau de fibrine insoluble qui arrête le saignement. transformant le

implanté dans le tissu, Tidespon® est résorbé en 3-5 semaines. Tidespon® ne provoque aucune réaction tissulaire ni aucune réaction d'hypersensibilité. L'avantage de Tidespon® est la possibilité d'être utilisé en concomitance avec un traitement antibiotique, ou avec l'administration de chimiothérapie ou

Indications:

Tidespon® est une éponge utilisable comme hémostatique locale, en procédures chirurgicales qui impliquent des saignements ou suintement tlicable et l'emploi de matériaux non résorbables n'est pas souhaitable.

Indicaciones:

Tidespon® es una esponja hemostática local para procedimientos quirúrgicos en los que se pueden producir hemorragias y goteos venosos, en situaciones en las cuales la hemostasis tradicional resulta difícil o impracticable, y se desaconseja el uso de materiales no absorbibles.

CODÉ CODE CÓDIGO	DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES CARACTERÍSTICAS	SIZE DIMENSION MEDIDAS	BOX CONFECTION CAJA
TS-80-50-10	STANDARD ESTÁNDAR	80 X 50 X 10 mm	10
TS-70-50-10	STANDARD ESTÁNDAR	70 X 50 X 10 mm	10
TS-80-50-01	SPECIAL SPÉCIAL ESPECIAL	80 X 50 X 1 mm	10
TS-70-50-01	SPECIAL SPÉCIAL ESPECIAL	70 X 50 X 1 mm	10
TS-60-20-07	SPECIAL SPÉCIAL ESPECIAL	60 X 20 X 7 mm	10
TS-80-30-00	TAMPON FOR COLONPROCTOLOGY TAMPON POUR COLON PROCTOLOGIE TAMPÓN PARA COLONPROCTOLOGIA	80 X Ø 30 mm	5
TS-60-20-00	TAMPON FOR COLONPROCTOLOGY TAMPON POUR COLON PROCTOLOGIE TAMPÓN PARA COLONPROCTOLOGIA	60 X Ø 20 mm	5
TS-10-10-10	DENTAL BLISTER BLISTER DENTAIRE BLISTER PARA DENTAL	10 X 10 X 10 mm	50
TSF-200-70-05	FILM FILM	200 X 70 X 0,5 mm	10
TSP-01	POWDER POUFRE POLVO	1 gr.	5
TSP-02	POWDER POUFRE POLVO	2 gr.	5



More than surgery

ITALIA

Headquarter

Zona Industriale
67062 Magliano dei Marsi (AQ), Italy
Tel. +39 0863 517956/515000
Fax +39 0863 570084/515209

Legal Office

Via G. Gregoraci, n.12
00173 Roma
Tel. +39 06 72677348
Fax +39 06 72675380

FRANCE

86-114 Avenue Louis Roche
Batiment D Hall-3 92230
Gennevilliers
Tel. +33 147985294
Fax +33 147985892

ESPAÑA

Poligono Landaben
Calle C, nave 1y2 - 31012
Pamplona (Navarra)
Tel. +34 948122274
Fax. +34 948120842

GERMANY

Prager Strasse 34
04317 Leipzig

UK

Unit 12a Barncliffe Mills
Shelley HD8 8LU Huddersfield
Tel. +44 1484602222

USA

55 NE 5th Avenue, Suite 501
33432 - 4093 Boca Raton FL
United States



RUSSIAN FEDERATION

c/o Studio Marzona
Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld. 7
107031 Moscow
Tel/Fax +7 962 9862804

BRASIL

Rua Professor Alfredo Gomes, 14
CEP 22551-080
Botafogo Rio De Janeiro
(RJ) Tel.: 0055 21 22661943
Fax: 0055 21 22663539

ALGERIE

Zone D'Activité Dar El Beida
Lot n° 66, Bt 12
Alger

TUNISIE

Rue 7316 Villa n° 5 - El Menzah 9B
1013 Tunis, Tunisie
Tel.: 00216 71875740
Fax: 00216 71880541

MAROC

Résidence Azhar, 24,
Rue Jalal Eddine Essayauti,
Rez De Chaussée n° 2
20100 Casablanca, Maroc

www.assuteurope.com
info@assuteurope.com



©2020 Assut Europe S.p.A. All rights reserved
CE 0373 - UNI EN ISO 9001:2015

Distribuido por JMS
DIST. 3155906790
3155265214